

เห็ดลม

ชื่ออื่น	เห็ดกระด้าง เห็ดซอน (อีสาน) เห็ดบด	
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	หมวดเห็ด เป็นรูปกรวยลึก สีขาวนวลหรือสีน้ำตาลอ่อนอมเทา เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8 ซม.เหนียวคล้ายหนัง ขอบงอเล็กน้อย ผิวมีขนสั้นๆสีน้ำตาลซึ่งรวมกันคล้ายเกล็ดเล็กๆ และปลายงอขึ้นเล็กน้อย เกล็ดเรียงกระจายออกไปยังขอบหมวดดอกอ่อนมีขอบบางและม้วนงอลง มีสีน้ำตาลอ่อนอมเทา บางและแคบ เมื่อแห้งจะเหนียวแข็งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง หรือน้ำตาลอมม่วง ครีบริบมีความยาวต่างกัน 5 ขนาดด้านในยาวขนานริ้วเล็กลงไปติดกัน ด้านนอกริ้วแคบไปติดขอบหมวด ขอบครีบริบเป็นจักฟันเลื่อยเล็กๆ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จะสากมือเวลาลูบ ครีบริบ แข็งแรง สีขาวนวลแล้วเปลี่ยนเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลดำ ยาว 0.5-2.5 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4-1.5 ซม. อยู่กึ่งกลางหมวดหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโคนใหญ่กว่าเนื้อในเห็ดสีขาวหม่นหรือขาวนวลอมเทาอ่อน ก้าน รูปสีขาวโค้งเล็กน้อย ผิวเรียบหนังบาง	สปอร์
การขยายพันธุ์	สปอร์	
ฤดูกาลเก็บส่วนขยายพันธุ์	-	
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต	เกิดบนขอนไม้ที่ผุที่มีความชื้นพอเพียง	
การใช้ประโยชน์	ทางอาหาร ทั้งดอกเห็ด นำมาแกงกับผักสดหัวแหวนหรือรับประทานสด ดอกเห็ดอ่อนใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริกตาแดง ทางยา บำรุงร่างกาย ชูกำลัง แก้ไข้พิษ	
ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์	ต้นฤดูฝนจนถึงปลายฤดูฝน	