

ผักแวง

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ชื่ออื่น | ผักแวง (ทั่วไป) ผักลิ้นปี (ใต้) | |
| ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ | ต้น | เป็นไม้ล้มลุกจำพวกเฟริร์น ลำต้นเป็นแหง่าเรียง ยาวยอดเลื้อย แตกกิ่งก้านอย่างไม่เป็น ระเบียบมีขนสีน้ำตาลอ่อน เมื่อขึ้นบนดิน ลำต้นสูง 2-3 ซม. ถืออยู่สนน้ำ 6-18 ซม. |
| | ใบ | ใบประกอบแบบพัด มีใบย่อย 4 ใบ ใบย่อย รูปพัดกว้างและยาวยอด 0.5-2 ซม. อับสปอร์ ออกเดี่ยวๆ หรือหลายอัน บนก้านชุดล้วนๆ รูปขอบขนาดมีขนที่ร่วงง่าย |
| การขยายพันธุ์ | ไหหละสปอร์ | |
| ฤดูกาลเก็บส่วนขยายพันธุ์ | - | |
| สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต | พบทั่วไปตามหนองน้ำที่ชื้นและในหนาแน่นช่วง ฤดูฝน | |
| การใช้ประโยชน์ | ทางอาหาร | ยอดอ่อนและเถาอ่อน รับประทานเป็นผักสด ร่วมกับน้ำพริกปลาทู น้ำพริกปลาาร้า |
| ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ | ทางยา | ทั้งต้น สมานแผลในปากคอ ระจับร้อน แก้ไข้ ร้อนในกระหายน้ำ ดับพิษ แก้ดีพิการ |
| | สิงหาคม-กันยายน | |